

2023年

赤とんぼも育てる減農薬米

稲作ごよみ

福岡市農業指導センター

福岡普及指導センター
福岡市農業振興課
福岡市東部農業協同組合
福岡市農業協同組合

夢つくし 元気つくし
稲の生育のめやす
ヒノヒカリ

5月 6月 7月 8月 9月 10月
浅水 中干し 間断かん水 浅水 間断かん水
活着 分けつ期 穂分化期 枝梗分化期 籾の退化期 花粉分化期 出穂 乳熟期 登熟中期 登熟後期 成熟期
田植 坪当たり 60株植
種肥 出穂20日前
落水 収穫
種子の消毒法
生卵による比重測定法
斑点半米対策

刈り取り後の注意 (出荷時水分14.0~15.5%)
●刈り遅れのないように。(「収穫期の穂の姿」を参照して下さい)
●乾燥は……低温で、ゆっくりと……
乾燥機投入
水分の平均化
乾燥機投入
停止
粗出し
目標水分15% (もち米は14%)

JAグループでは、より安心して食べていただけるお米を安定供給する「JA米」ブランドの確立を目指しています。
①品種確認できた種子により生産した米穀であること。
②農産物検査を受検した米穀であること。
③栽培履歴記帳を確認した米穀であること。
箱施薬
粉剤体系
粒剤体系
水剤・水溶剤等

作業管理記録簿
種子消毒 播種 元肥 田植 除草 穂肥 落水 稲刈り
月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日
方法 肥料名 坪 株植 肥料名 肥料名
農薬名 施肥量

一番こわいのは、気づかぬうちにジワジワ体をおかす慢性中毒です。
①マスクは常識 ②妊娠中、生理中、体の調子が悪いときは、散布しない。
③散布途中はタバコを吸わない。終わってから酒を飲まない。 ④散布が終わったらうがいをし手顔をせっけんで洗う

除草剤のめやす
●初期除草剤
①ウイニングランジャンボ
田植後~10日、10a当たり10袋(500g)
②プライオリティジャンボ
田植後~12日、10a当たり10袋(250g)
③ジェイソウルフロアブル
田植後~10日、10a当たりボトル1本(500ml)
④ポデーガードプロ1キロ粒剤
田植後5~12日、10a当たり1kg
⑤ポデーガードプロジャンボ
田植後5~12日、10a当たり10袋(300g)
●中後期除草剤
⑥クリンチャーバスME液剤
田植後15日~ノビア5葉期 100倍(落水後散布。散布後3日間は入水しない)
⑦アトトリ豆つぶ250
田植後14日~ノビア4葉期、10a当たり250g

肥料のめやすと土づくり
肥料のやり方
(深耕は基本です)
①施肥
品種 ヒノヒカリ 夢つくし 元気つくし
元肥 穂肥 元肥 穂肥 元肥 穂肥2
有機質肥料利用型 赤とんぼの里40kg 赤とんぼの里30kgまたは粒状なたね油粕60kg 赤とんぼの里40kg 赤とんぼの里20kgまたは粒状なたね油粕40kg 赤とんぼの里40kg 赤とんぼの里20kg 赤とんぼの里15kgまたは粒状なたね油粕30kg
有機質肥料一発型 有機エムコート077 70kg
元肥一発型 LP2000 35kg エムコート48号 35kg LP2000 35kg 尿硫燐48号 0~10kg(葉色が悪い場合)
慣行型 尿硫燐48号 25kg 赤とんぼの里35kgまたはベスト化成444 30kg 尿硫燐48号 25kg 赤とんぼの里20kgまたはベスト化成444 30kg 尿硫燐48号 25kg 赤とんぼの里20kg 赤とんぼの里15kgまたはベスト化成444 10kg
②土壌改良材
土壌改良材名 施用量のめやす 土壌改良材名 施用量のめやす
粒状ミネラルG 珪酸加里 40kg/10a
ケイカル パワーリン5号
ケイ鉄 アツミン
③有機物の投入
有機物の種類 成分(%) 田んぼでのめやす(10a)
チッソ リン酸 カリ
レンゲ 0.4 0.1 0.3 4~5t
牛ふん堆肥 0.5 0.4 0.4 2t
乾燥鶏ふん 4.0 4.5 2.5 100~200kg
生鶏ふん 1.6 1.5 0.9 200~300kg