


2025年
赤とんぼも育てる減農薬米

稲作ごよみ


福岡市農業指導センター

福岡普及指導センター
福岡市農業振興課
福岡市東部農業協同組合
福岡市農業協同組合



刈り取り後の注意 (出荷時水分14.0~15.5%)

- 刈り遅れのないように。(「収穫期の穂の姿」を参照して下さい)
- 乾燥は……低温で、ゆっくりと……。



低コスト除草剤

- サラブレットKAIフロアブル 田植時~10日まで 10a当たり500ml
- サラブレットKAIジャンボ 田植直後~10日まで 10a当たり10袋(400g)
- サラブレットKAIヒロ粒剤 田植時~10日まで 10a当たり1kg
- サラブレットKAI400FG 田植直後~10日まで 10a当たり400g

箱施薬

- 防入箱粒剤・50g/箱(は種期~田植当日まで)
- いもち病・もみ枯細菌病・ウンカ類・コブノメイガ
- スクラム箱粒剤・50g/箱(移植3日前~田植当日まで)
- いもち病・紋枯病・もみ枯細菌病・ウンカ類・コブノメイガ
- ブーンハーデス箱粒剤・50g/箱(は種期~田植当日まで)
- いもち病・紋枯病・ウンカ類・コブノメイガ

JAグループでは、より安心して食べていただけるお米を安定供給する『JA米』ブランドの確立を目指しています。JA米とは下記の3つの条件を全て満たしたお米です。

- ①品種確認できた種子により生産した米穀であること。
 - ②農産物検査を受検した米穀であること。
 - ③栽培履歴記帳を確認した米穀であること。
- 左記要件を満たさない米穀は一般米となりますのでJA米とは分けて出荷して下さい。

粒剤体系

- スタークル豆つぶ・250g/10a(収穫7日前まで)
- ウンカ類・カメムシ類
- スタークル粒剤・3kg/10a(収穫7日前まで)
- ウンカ類・カメムシ類
- キラップ粒剤・3kg/10a(収穫14日前まで)
- ウンカ類・カメムシ類
- モンガリット粒剤・3kg/10a(収穫30日前まで)
- 紋枯病・稲こり病
- ワイドバンチ豆つぶ・250g/10a(収穫35日前まで)
- ウンカ類・カメムシ類・いもち病・紋枯病・稲こり病

(粉、水和剤より7~10日早く施用)

粉剤体系

- エクシード粉剤DL・3kg/10a(収穫7日前まで)
- ウンカ類・カメムシ類

水和剤・水溶剤等

- ノンプラスフロアブル・1000倍(収穫7日前まで)
- いもち病・稲こり病
- スタークル顆粒水溶剤(収穫7日前まで)
- ウンカ類3000倍 カメムシ類2000倍
- ウンカ類・カメムシ類(ただし、出穂期間使用不可)
- キラップフロアブル・2000倍(収穫14日前まで)
- ウンカ類・カメムシ類

ジャンボタニシ対象薬

- スクミン・1~4kg/10a(収穫60日前まで)
- スクミンバイト3・2~4kg/10a(発生時)

作業管理記録簿	種子消毒	播種	元肥	田植	除草	穂肥	落水	稲刈り
	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
	方法		肥料名	坪 株植	方法	肥料名		
	農薬名		施肥量		農薬名	施肥量		

一番こわいのは、気づかぬうちにジワジワ体をおかす慢性中毒です。

- ①マスクは常識
- ②妊娠中、生理中、体の調子が悪いときは、散布しない。
- ③散布途中はタバコを吸わない。終わってから酒を飲まない。
- ④散布が終わったらうがいをし手顔をせっけんで洗う

※注意事項
処理後7日間、落水、かけ流しは控えます。
使用前にラベルや説明書をよく読んで下さい。

●初期除草剤

- ①ウィニングランジャンボ 田植直後~10日、10a当たり10袋(500g)
- ②ブライオリティジャンボ 田植直後~12日、10a当たり10袋(250g)
- ③ゼータプラスジャンボ 田植後3~12日、10a当たり10袋(200g)
- ④ボデーガードプロ1キロ粒剤 田植後5~12日、10a当たり1kg
- ⑤ボデーガードプロジャンボ 田植後5~12日、10a当たり10袋(300g)

●中後期除草剤

- ⑥クリンチャーパスME液剤 田植後15日~ノビエ5葉期 100倍 (落水後散布。散布後3日間は入水しない)
- ⑦アトトリ豆つぶ250 田植後14日~ノビエ4葉期 10a当たり250g

肥料のやり方

- ・元肥をすきこんだ後は、なるべく早く水を入れましょう。
- ・穂肥は出穂20日前頃です。なお、葉色を見て早めたり、遅めたり、量を控えたり、やめたりします。
- ・有機質肥料は肥効が遅く、長く効きますので、穂肥に使うときは化学肥料の場合より7~10日早めに施用しましょう。

①施肥

品 種	ヒノヒカリ		夢つくし		元気つくし		
	元 肥	穂 肥	元 肥	穂 肥	元 肥	穂 肥	穂肥2
有機質肥料 利 用 型	赤とんぼの里 40kg	赤とんぼの里30kg または 粒状なたね油粕 60kg	赤とんぼの里 40kg	赤とんぼの里20kg または 粒状なたね油粕 40kg	赤とんぼの里 40kg	赤とんぼの里20kg または 粒状なたね油粕 40kg	赤とんぼの里15kg または 粒状なたね油粕 30kg
有機質肥料一発型	有機エムコート077 70kg	—	—	—	—	—	—
元肥一発型	Jコート2000晩稲 35kg	(葉色が薄い場合) 尿硫燐48号 10kg	Jコート2000 30kg	(葉色が薄い場合) 尿硫燐48号 10kg	Jコート2000晩稲 35kg	(葉色が薄い場合) 尿硫燐48号 10kg	—
慣 行 型	尿硫燐48号 25kg または ベスト化成444 30kg	赤とんぼの里35kg または ベスト化成444 20kg	尿硫燐48号 25kg または ベスト化成444 30kg	赤とんぼの里20kg または ベスト化成444 15kg	尿硫燐48号 25kg または ベスト化成444 30kg	赤とんぼの里20kg または ベスト化成444 15kg	赤とんぼの里15kg または ベスト化成444 10kg

②土壌改良材

土壌改良材名	施用量のめやす	土壌改良材名	施用量のめやす
粒状ミネラルG	200kg/10a	珪酸加里	40kg/10a
ケイカル		パワーリン5号	
ケイ鉄		アズミン	

③有機物の投入

- ・化学肥料だけに頼らず、有機物を積極的に使い土づくりを心がけます。
- ・ただし、右表を目安にして、チッソ成分が多すぎないように注意しましょう。
- ・堆肥は多すぎないように、適正量を遅くとも3月までに入れましょう。

有機物の種類	成 分 (%)			田んぼでのめやす(10a)
	チッソ	リン酸	カリ	
レンゲ	0.4	0.1	0.3	4~5 t
牛ふん堆肥	0.5	0.4	0.4	2 t
乾燥鶏ふん	4.0	4.5	2.5	100~200kg
生鶏ふん	1.6	1.5	0.9	200~300kg

(深耕は基本です)

地球温暖化防止
稲わらは秋にすき込み、腐熟を進めましょう!
(田植後メタセダスの発生が少なくなり、地球温暖化防止に役立ちます)

栽培履歴を記帳しましょう。大切なのは『根を活かす稲作り』

普及センター
092-806-3400

営農生活課
092-621-4696

育苗センター
092-691-8180

多々良農業倉庫(土井倉庫)
092-691-3007

令和7年1月作成